




HONGOS DE SOMBRERO



Especies encontradas en la Reserva Los Robles:

Agrocybe allocystis

Estacionalidad: En Primavera.

Observaciones: Esporada castaña a violácea.



Chamaeota sphaerospora

Estacionalidad: En verano y otoño.

Observaciones: Esporada rosada.



Crepidotus nephrodes

Estacionalidad: En otoño.

Observaciones: Esporada castaña.



Dictyopanus pusillus

Estacionalidad: En otoño.

Observaciones: Esporada blanca.



Gymnopilus spectabilis

Hongo de la carcajada

Estacionalidad: En verano y otoño.

Observaciones: Esporada rojiza.



Hohenbuehelia grisea

Estacionalidad: En otoño.

Observaciones: Esporada blanca.



Hypholoma fasciculare

Estacionalidad: En primavera, verano y otoño.

Observaciones: Esporada violácea.

Causa pudrición blanca.

Tóxico.



Pleurotus albidus

Girgola

Estacionalidad: En otoño.

Observaciones: Esporada blanquecina.



Pleurotus djamor

Girgola

Estacionalidad: En otoño.

Observaciones: Esporada blanquecina.



Pleurotus ostreatus

Girgola

Estacionalidad: En otoño.

Observaciones: Esporada blanquecina.



Psathyrella sp.

Estacionalidad: En primavera, verano y otoño.

Observaciones: Esporada castaña casi negra.



Schizophyllum comune

Estacionalidad: Anual.

Observaciones: Esporada blanquecina.



Agaricus placomyces

Estacionalidad: En otoño.

Observaciones: Esporada castaña.

Tóxico.



Stropharia rugosoannulata

Estacionalidad: En otoño.

Observaciones: Esporada castaño purpúrea casi negra.



Coprinellus disseminatus

Estacionalidad: Anual.

Observaciones: Esporada castaña casi negra.

Se licúa.



Coprinellus domesticus

Estacionalidad: Anual.

Observaciones: Esporada negra.

Se licúa y desintegra rápidamente.



Coprinellus micaceus

Estacionalidad: En primavera.

Observaciones: Esporada negra.



Cyptotrama asprata

Estacionalidad: En otoño.

Observaciones: Esporada blanquecina.



Hypholoma puiggarii

Estacionalidad: Anual.

Observaciones: Esporada violeta.



Laccaria lacata

Estacionalidad: En otoño.

Observaciones: Esporada blanca.



Mycena haematopoda

Estacionalidad: En verano y otoño.

Observaciones: Esporada blanquecina.

Al cortarse fluye látex rojizo.



Russula atropurpurea

Estacionalidad: En verano y otoño.

Observaciones: Esporada blanquecina.

